



El trigo va por un nuevo récord en la región, se sembrarán 1,8 M ha

Se sembrarán 50 mil hectáreas más que el año anterior. Necesidad de rotar y contar con liquidez a fin de año son los motores de la siembra récord.

¿Puede llover el martes y miércoles próximos?

Quedan atrás las temperaturas muy bajas y hay probabilidades de tormentas en el norte de la región.

Las proyecciones para el resto de mayo, junio y julio muestran una tendencia de lluvias normales, comenta José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas

Necesidad de rotar y contar con liquidez a fin de año, los motores de la siembra del cereal

Los márgenes actuales, la necesidad financiera y la mantención de las rotaciones son sin dudas los factores claves de esta nueva siembra triguera. Más allá de algunas retracciones puntuales, la siembra de trigo volverá a ser récord en la región. El trigo se extenderá sobre unas 50 mil hectáreas más que el año anterior, el crecimiento es de casi un 3%. También las lluvias de abril han tenido mucho que ver, pero el precio del cereal y su relación con los precios de los otros cultivos cambiaron el escenario a favor del cereal. En esta semana se han sembrado los primeros lotes. En una semana se larga en forma generalizada el desafío de alcanzar un nuevo hito en la región núcleo: **implantar 1,8 M ha con trigo en cuarentena.**

¿Puede crecer más el área de trigo?


Si lloven 10 a 15 mm, sobre todo en el este de Córdoba, puede seguir creciendo. Dónde más se nota el aumento de área triguera es en el **norte de Buenos Aires**. Las lluvias allí han sido más generosas permitiendo partir con **excelentes reservas de agua en el suelo**. Pero hay otra variable: **el maíz**. Se busca mantener la rotación, conservando la relación entre las hectáreas de gramíneas (trigo y maíz) con las de soja. Y la estrategia es sumar con trigo lo que se deje de hacer con maíz, señalan en el corredor que une Pergamino, Ferré, Colón y Wheelwright.

Todo listo para sembrar respetando la cuarentena

El 20 de mayo es la fecha de la gran largada. Se comenzará la siembra de los ciclos más largos de trigo, aunque en el este de Córdoba ya comenzaron en esta semana con algunos lotes aislados. **Ingenieros y productores señalan que se están siguiendo con todas las precauciones y protocolos de seguridad utilizados en la cosecha, ahora en la siembra triguera.** Las reservas de agua son ideales para el arranque del cereal, también comentan en el área. Solo en sectores del este cordobés se está necesitando una lluvia de 10 a 15 mm para contar con humedad superficial. Además, hay un entusiasmo por mantener la tecnología utilizada la campaña anterior. La relación precio del cereal-insumo alienta a un mayor uso de insumos, maximizando la productividad por hectárea.

El frío ya muestra indicios de que acompañará al trigo

Las bajas temperaturas no cesan de registrarse a cada semana, **alejando la amenaza de un próximo invierno cálido**. El frío, aparte del agua es otro factor vital en el desarrollo y éxito del cultivo. La reciente madrugada del 14 de mayo fue el día más frío en lo que va de mayo: amaneció con temperaturas bajo cero grado en gran parte de la Región Pampeana. **El centro sur de Buenos Aires fue la zona donde se registraron los valores más bajos:**



Elaborado con datos propios y publicos del SMN


Tandil marcó -3.3 °C, Coronel Suárez -3.1 °C, Azul registró -2.3 °C y Bolívar -2 °C. En la región núcleo, los termómetros del **sudeste cordobés** quedaron sumergidos con temperaturas por debajo de cero. **Canals midió -0.6 °C y Monte Buey -0.5 °C.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas:






Semana al 14 de mayo de 2020 - N° 658- AÑO X - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



LLUVIAS DIARIAS A NIVEL NACIONAL




GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas:





SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

Esta semana comienza la siembra de trigo de ciclo largo en **San Martín de las Escobas**. Los técnicos mencionan que la superficie **se mantendrá similar** a la de la campaña anterior. Al consultar por los alquileres de los campos, los mismos se están cerrando **con iguales valores** que el año pasado. **Se estima que la superficie de maíz de la próxima campaña tampoco sufrirá variaciones. Se mantiene activa la compra de insumos.** Al repasar números de la campaña que está finalizando, la soja de primera terminó con un rinde promedio de **40 qq/ha** y la de segunda con **30 qq/ha**. El maíz temprano registró un promedio de **100 qq/ha** y para los de segunda se estima que el rinde fluctuara **entre 50 y 80 qq/ha**, según el tipo de suelo.

Ya está todo preparado para recibir al trigo en **Cañada de Gómez**. Los barbechos se han hecho sin inconvenientes en el control de malezas. Los ingenieros señalan que la intención de siembra **se mantendrá** respecto a la del año pasado, **al igual que la tecnología y la fertilización.**

Respecto a la próxima campaña de maíz, los profesionales advierten habría **una disminución del 30% de la superficie en campos alquilados supeditada por el precio del cereal.** ¿Cómo cerró la campaña 19/20? La soja de primera finalizó con un rinde promedio de **43 qq/ha** y la de segunda con **20 qq/ha**. El maíz temprano promedio **111 qq/ha**.

En 10 o 15 días arranca la actividad de las sembradoras de trigo por el corredor que une **Cañada de Gómez y Villa Eloisa**. **Se espera que la intención de siembra baje un 10%** respecto a la del año pasado. **El temor por las decisiones políticas que puedan afectar al sector y la posibilidad de un Niña influyen a la hora de concluir.** **Por otro lado, la necesidad de rotar con gramíneas y contar con liquidez a fin de año son el motor de la siembra del cereal.** Esta semana arrancaron los barbechos y se encontraron malezas de difícil control, como Eragrostis, Comelina, Coniza. En algunos lotes se observan Nabo resistente y Ray Grass. Los ingenieros advierten que este año **se va a invertir menos en tecnología, el fertilizante será el insumo donde más se va a bajar el costo.** Respecto a la superficie de maíz 20/21, los profesionales indican que **se mantendrá respecto a la campaña anterior.** **El costo de la semilla y los fertilizantes inciden mucho más que la posibilidad de contar con periodo más seco hacia fin de año.** "Aunque en un principio la inversión en maíz es mayor que en soja, a la larga tienden a igualarse debido a la demanda de herbicidas de la oleaginosa; por lo que el principal factor para decidir por el cereal es la mayor rentabilidad respecto a la soja de primera", comentan los técnicos. La cosecha de soja 2019/20 finalizó con un rinde promedio de **45 qq/ha** en soja de primera y **25 qq/ha** en la de segunda. El maíz temprano promedió **105 qq/ha**. Se esperan entre **70 a 80 qq/ha** para el maíz tardío y el de segunda.

"La siembra se larga fuerte **después del 20 de mayo**", comentan los ingenieros de **Carlos Pellegrini**. **Se va a**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

Nueva forma de comprar
y financiar tus
insumos agrícolas





Semana al 14 de mayo de 2020 - N° 658- AÑO XI - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

umentar entre un 10 a 15 % la superficie del año pasado. **En estos días se activó la demanda y nuevos lotes se sumaron a la intención de siembra.** Se están haciendo los barbechos y muchos productores adelantarán la aplicación de fertilizantes a la siembra. Además, se están haciendo los cultivos de cobertura para el resto de los cultivos de verano. La demanda de maíz se ve estancada por el momento, de todos modos la decisión está tomada en el 80% de los productores que están haciendo los barbechos para el cultivo, por lo que **abría una reducción de un 10%** respecto al otro año; **pero aún resta ver ese 20 % que no se ha decidido** y no ha realizado los barbechos. **Los buenos rindes obtenidos en este año harán que no baje demasiado la siembra del mismo y además la toma de conciencia de la rotación sigue siendo importante.**

En los alrededores de Cañada Rosquin se mantendrá o aumentara un 10% el área de siembra con trigo. En una semana se iniciara la siembra con los ciclos intermedios y largos. **La tecnología que se utilizara será igual o superior a la de la campaña pasada, "cada vez se toma más conciencia del uso de la misma y su consecuente aumento de producción por hectárea y no tanto del aumento de superficie",** reflexionan los ingenieros, **"el aumento de uso de fertilizante en cantidad y calidad es notorio".** También los cultivos de cobertura favorecen a la estructura y nutrición del suelo y por ende a los cultivos que se implantan sobre ellos. En cuanto a la superficie de maíz 20/21 **se mantendrá el área** respecto a la del año pasado. **Los productores pequeños están reticentes a comprar la semilla por el bajo valor del grano, no así otros que con mayor solvencia mantienen su posición de mantener rotaciones, que en un periodo no lejano les devuelve la inversión en cultivos posteriores al mismo.** En lo que respecta a la cosecha 19/20, los maíces de segunda sobre trigo han sufrido la falta de lluvias, por lo que se estima un rinde de ente **80 a 90 qq/ha.** Los maíces tardíos poseen mejores expectativas de rindes, **120 qq/ha.** La cosecha

se iniciaría entre mediados y fines de junio. Las altas temperaturas de marzo y la falta de precipitaciones en algunos casos, aceleraron el proceso de secado.

SUBZONA II

En 15 a 20 días comienza la siembra de trigo en Bombal. Los ingenieros indican que se van a mantener las rotaciones, por lo que **el área sería similar** a la del año pasado. **Tampoco habrá variaciones en la tecnología y la fertilización a utilizar.** Los técnicos indican que si bien no se escuchan muchos valores de alquileres, puede haber algunas rebajas de los mismos. **Se están comprando las semillas y demás insumos para el maíz 20/21, pero las proyecciones de área no son muy entusiastas, algún porcentaje va a disminuir.** "La inversión inicial en semilla es muy elevada y existe el temor por la suba de retenciones", indican.

En **Bigand** se está planificando el inicio de siembra triguera para **después del 20 de mayo.** "Continuamos con la misma superficie que la campaña anterior", indican los ingenieros. Los barbechos para trigo están realizados, como maleza preocupante en la región se encuentra el **Ray Gras resistente y la Rama negra.** En cuanto a tecnología aplicable a trigo, **"los productores de avanzada, un 25 %, usarán lo mejor, con buenas dosis de nitrógeno, sumado a fósforo, azufre y zinc, variedades altamente productivas, aplicación de los mejores fungicidas y fertilización foliar; el resto utilizará lo de siempre: un arrancador como fósforo, nitrógeno, por ejemplo 100 kg de MAP u otro similar y 150 kg de urea voleada, curasemilla clásico, control de enfermedades foliares con triazoles",** explican los profesionales. **Por el momento no habría reducción de maíz en campos alquilados, ya que lo tienen programado con una rotación donde hacen un maíz cada 2 ó 3 años de soja.** Las mayores preocupaciones para el productor que alquila están centradas en el escenario local y los cambios en los

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





derechos de exportación. **"Considerando las bolsas de híbridos reservados, no comprados, habría un crecimiento en 10 % en la región. Pero hay un cambio en las reglas de juego, no se va a concretar una intención superior"**, indican los técnicos. **Los propietarios ya han comprado la semilla de maíz. Ellos mantendrán la intención de siembra.** Estos productores, realizan rotación con frecuencia, incluso el maíz va detrás de un trigo/soja de segunda. En cuanto a la campaña que está finalizando, restan unos pocos lotes de maíz temprano por recolectar; el rinde promedia **107 qq/ha**. Los pocos lotes de maíz tardío y de segunda que se cultivaron se estiman con bajo rinde. "Aquel que no tiene cosechadora propia, **debe superar los 30 a 40 qq/ha para justificar la cosecha**", mencionan. La soja de primera termino con un rinde de **35 qq/ha** y la de segunda con **25 qq/ha**.

SUBZONA III

El próximo lunes comienza la siembra de trigo en el corredor que une Pergamino, Ferré, Colón y Wheelwright. Los ingenieros estiman un aumento del área de un **3%** respecto de la del año pasado. "Es probable que se utilice **muy buena tecnología ya que la relación de precio con los fertilizantes es buena**", indican. **Los alquileres estas cerrando en los mismos valores que la campaña anterior.** En lo que respecta al maíz 20/21, **la tendencia es a bajar la superficie, todo dependerá de los precios futuros en julio y agosto y el pronóstico climático.** "La superficie que se incrementara en trigo, se bajara en maíz", señalan. Quedan muy pocos lotes de soja por recolectar. Los rindes en soja de primera mediaron **35 qq/ha** y en la de segunda **20 qq/ha**. Resta un **20%** de la superficie de maíz temprano por cosechar. El rinde promedia **105 qq/ha**. Se esperan buenos resultados para los maíces tardíos y de segunda.

La fecha de largada de la siembra de trigo en **San Antonio de Arco** es el **25 de mayo**. **La intención de siembra se mantiene igual a la del año pasado.** Se están pulverizando los primeros lotes destinados a trigo y "las malezas que se ven son las de siempre: **Rama negra y Ray grass resistente**", señalan los ingenieros. La tecnología que se utilizara será **media a alta como se acostumbra en la zona**. Los técnicos indican que no habrá grandes cambios en los contratos de los alquileres. Respecto al maíz **2020/21**, **"hay muchos planes y propuestas de parte de los semilleros para la semilla, pero es poco el entusiasmo de los productores. Solo los propietarios de los campos conservan la rotación y ya están adquiriendo los insumos, manteniendo su área de maíz; el resto está a la espera"**. Por lo tanto se espera que la superficie se **mantenga, pero dependerá de los precios y a cambios de política en el sector**. Llegando casi al final de la campaña 2019/20, la cosecha de soja de primera termino con un rinde promedio de **32 qq/ha**, mientras que en la de segunda todavía queda un **30% por cosechar**. El rinde promedia **12 qq/ha**. El maíz temprano finalizo su ciclo con un promedio de **80 qq/ha**.

SUBZONA IV

Hacia fines de mes comenzara la siembra de trigo en **Lincoln**. **Los ingenieros estiman que la superficie podría mantenerse o bajar levemente**, "todo dependerá de las pólizas comerciales que puedan surgir en estos próximos días", mencionan. **Esta campaña se va a utilizar una menor tecnología, menor fertilización.** En cuanto al maíz 20/21, **"todavía no se ve una activa demanda de insumos"**, declaran los técnicos. **Se estima una disminución del área y su reemplazo por soja de primera por su menor inversión inicial.** La campaña 2019/20 está finalizando; la cosecha de soja de primera terminó con un rinde medio de **35 qq/ha**. Queda un **40%** de la superficie de la de segunda por trillar con rindes

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





promedio entre **20 a 24 qq/ha**. Restan unos pocos lotes de maíz temprano, con un rinde promedio de **100 qq/ha**.

SUBZONA V

"En la zona de **Monte Maíz hacia el oeste, creen que los alquileres no sufrirían una variación. Esto se debe a que el cultivo de maní mantiene los valores al alza.** En cuanto al cultivo de trigo, **comenzó la siembra en pocos lotes que contaban con baja humedad.** En la zona pretenden aumentar un **5 a 10% el área de siembra y ajustar al alza la fertilización de azufre y nitrógeno.** "Se necesitaría una lluvia de **10 a 15 mm para confirmar este aumento de área de siembra porque se necesita humedad superficial**", aclaran los técnicos En cuanto a maíz 2020, se pretende **mantener** el área cultivada respecto al año pasado. **En la zona cuentan con la influencia de la napa y eso mantiene las expectativas de obtener buenos rindes si se aplica buena tecnología.** La cosecha de soja 2019/20 finalizó con **47 qq/ha** de promedio, con un rango de variación de **45 a 55 qq/ha**. La soja de segunda obtuvo buenos resultados en torno a **37 a 38 qq/ha**, con fluctuaciones de **32 a 40 qq/ha**. En cuanto al maíz, se sigue cosechando con rindes de **128 a 130 qq/ha**, mientras que el tardío sigue en pie con buenas expectativas de rindes en torno a **100 qq/ha**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la **región núcleo**

¿Puede llover el martes y miércoles?

Quedan atrás las temperaturas muy bajas y hay probabilidades de tormentas en el norte de la región.

El ingreso de aire frío y seco que acompaña el desplazamiento de un importante centro de alta presión por la porción central del país genera tiempo estable y temperaturas muy bajas, con presencia de heladas durante la jornada de hoy, jueves 14. Luego, las marcas térmicas ascenderán paulatinamente.

*El único momento en la semana en el que se esperan condiciones de tiempo inestable es entre **el martes y miércoles próximo**, momento en el cual la humedad y la estructura vertical de la tropósfera provocarán condiciones de tiempo inestable. Es probable el desarrollo de algunas tormentas aisladas, especialmente sobre el norte de la región.*

Se prevé que los registros térmicos más bajos del período se concentren durante la jornada de hoy, jueves 14, con episodios de heladas en varios puntos de la región. Las temperaturas comenzarán a ascender progresivamente hacia el fin de semana y los primeros días de la próxima, alcanzando valores superiores a los parámetros normales para la época del año.

La circulación del viento prevalecerá del sector sur sólo durante la jornada de hoy, ya que rápidamente se posicionará del sector oeste o noroeste con intensidad moderada. Esta situación potenciará el ascenso de las marcas térmicas antes mencionado. En general, el viento, será de débil intensidad, salvo entre el viernes y sábado cuando la misma se presentará moderada con algunas ráfagas.

Se espera una semana con poco cambio de la cobertura nubosa. El cielo se mantendrá mayormente despejado por la presencia del importante centro de alta presión recién hacia el próximo martes o miércoles podría comenzar a producirse un incremento de la nubosidad sobre la región GEA.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la **región núcleo**

Sin lluvias, ya acecha el frío del otoño

Los registros oscilaron entre 2 y 4°C. El valor más bajo fue de 1,3°C y se midió en Bellville.

En cuanto a las marcas térmicas, se observaron registros máximos moderados para la época del año con un promedio entre 24°C y 27°C. Las más elevadas de la semana se concentraron sobre la franja norte de la región, especialmente sobre el centro de Santa Fe. El registro más alto fue de 29,8°C, en la localidad de Noetinger.

Las marcas mínimas se presentaron levemente por debajo de los niveles medios estacionales, e inferiores a los de la semana pasada. **En promedio, los registros oscilaron entre 2 y 4°C, con el valor más bajo, de 1,3°C, en la localidad de Bellville.**

Se puede observar que las condiciones de humedad del suelo continúan siendo **muy buenas, con características óptimas sobre la provincia de Buenos Aires**. El resto de la región presenta condiciones de humedad de **adecuadas a regulares** y la única zona que todavía presenta reservas escasas ha quedado acotada al centro de Córdoba.


Para los próximos 15 días la necesidad de lluvia es nula sobre la mayor parte de la región núcleo, salvo en los sectores de la provincia de **Córdoba que requieren entre 40 y 60 mm** para alcanzar niveles de humedad edáfica óptimas.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





Semana al 14 de mayo de 2020 - N° 658- AÑO XI - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Tres meses con lluvias normales

"Sin forzantes de escala global, las proyecciones muestran que el resto de mayo, junio y julio tendencia a que se alcancen los valores normales", comentan José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas

Tal como mencionamos en el informe de la semana pasada la transición hacia un clima más otoñal está sosteniendo una circulación poco favorable para el desarrollo de sistemas precipitantes. En los últimos siete días la ausencia de lluvias fue total en las regiones productivas de la zona núcleo. La excepción fueron algunos desarrollos moderados sobre el noreste de la **mesopotamia** (Corrientes y Misiones) y sobre el centro oeste de la **Patagonia** (Bariloche, el Bolsón y Esquel) donde los acumulados semanales superaron los **60 milímetros**.

Aun con este aporte pluvial deficitario durante la segunda semana de mayo la disponibilidad de humedad sigue siendo óptima en la mayoría de los sectores donde las siembras generalmente comienzan temprano. La posibilidad de contar actualmente con un escenario tan favorable permite comprender en su justa medida la dimensión y relevancia que tuvieron las

precipitaciones de finales de abril en la recarga de los perfiles de la mayoría de las zonas aptas para trigo. **En este sentido debemos señalar que, si bien la mejor parte se la llevó Buenos Aires, algunos otros sectores como el sudeste de Córdoba, o el centro sur de Santa Fe, donde los acumulados no fueron tan notorios, también presentan una disponibilidad de humedad edáfica entre adecuada y óptima que les permitirá incorporarse al arranque de la fina sin mayores problemas.**

Sin forzantes de escala global, las proyecciones muestran que el resto de mayo, junio y julio presentarán una oferta de agua discreta, con tendencia a que se alcancen los valores normales. Hay que tener en cuenta que las lluvias medias del trimestre frío, en general, son pobres. Con un aporte de lluvias más ajustado es lógico esperar un retroceso en las reservas de humedad sin embargo, dado que no hay coberturas con demanda y tampoco exigencias atmosféricas, las actuales condiciones continúan presentando un contexto favorable para el arranque de la fina.


GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



Semana al 14 de mayo de 2020 - N° 658- AÑO XI - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR.